

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE



Circonscription
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGIO -

☎ (95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 57

du 14 MAI 1985

V I G N E

MILDIU :

Les pluies du 11, 12 et 13 Mai ont été suffisantes pour être contaminatrices et les risques d'apparition de mildiou sont en augmentation.

Un 1er traitement pourra être réalisé dans les parcelles atteintes en 1984, ainsi qu'en situations humides, bas fonds et parcelles situées en bordure de mer. Ailleurs attendre l'apparition de foyer primaire.

Vous avez le choix entre :

* Les fongicides à base de captafol, cuivre, folpel métirame de zinc, captane, carbatène, dichlofluanide, dithianon, mancopper, manébe, mancozèbe, zinébe et propinébe. Ils sont **préventifs**. La protection dure 10 à 12 jours sans pluie (20 à 25 mm de pluie lessivent le produit).

* Les fongicides à base de cymoxanil, ils sont **pénétrants**. La protection dure 10 à 12 jours même en présence de la pluie, ils ne protègent pas les organes formés après le traitement (SYPHAL, CUPROFIX, SYGAN, ANTEOR, FULVAX, REMILTINE, AVISO, DIAMETAN, NOVOFIX...).

* Les fongicides à base de phosethyl-al, metalaxyl, ofurace, benalaxyl et oxadixyl sont **systémiques**. Ils sont transportés par la sève. (MIKAL, RHODAX, ACYLON SUPER F, CALTAN, CALTAN C, VAMIN, GALBEN F, GALBEN M, PULSAN, SIRDAT).

RAPPEL : ACYLON SUPER F, VAMIN, CALTAN C, GALBEN F et GALBEN M ne doivent pas être utilisés plus de 2 à 3 fois pendant la saison, sinon il y a risque d'apparition de souches résistantes.

Tordeuses de la grappe :

Ne pas intervenir en préventif sur cette 1^{re} génération. Attendre l'apparition des glomérules pour décider d'un traitement. Un prochain bulletin fera le point.

=====

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX 1985 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

P13